

Informace pro dětské lékaře (návrh)

20. listopadu 2013 vydalo MZ ČR Metodiku k provádění pravidelného očkování proti TBC v ČR (2. aktualizované vydání). Podle této metodiky je možné očkovat děti na přání rodičů s tím, že rodiče toto dobrovolné očkování uhradí. Odstraňují se tím určité pochybnosti, které vznikaly kolem této možnosti na základě ne zcela přesných formulací předchozí metodiky.

Za pouhé 3 roky od zrušení plošné BCG vakcinace začínáme pozorovat negativní dopady tohoto rozhodnutí. Dvě děti již onemocněly bazilární meningitidou (diseminovaná forma TBC, která se u nás při důsledné proočkovanosti populace nevyskytovala po celých 50 let). Další závažný problém je, že u neočkovaných dětí, které přichází na dobrovolné očkování, se již objevuje pozitivní tuberkulinový test (což znamená, že děti přišly do kontaktu s TBC, čili byly infikovány) a my musíme nasazovat chemoprophylaxi na 6 měsíců za pravidelných laboratorních kontrol, kdy musíme kontrolovat JT, KO, pro nebezpečí poškození těchto orgánů. Stejná situace nastala při realizaci studie ve třech krajích v letech 1985 – 1993, kde se omezilo povinné očkování jen na rizikové skupiny a vedla k obnovení plošného očkování na celém území republiky. Ukazuje se, že TBC infekce v populaci je. Děti jsou přitom nejvíce ohroženou skupinou.

V r. 2010 byla uveřejněna informace Výzkumné jednotky pro tuberkulózu v Londýně v časopise Torax, podle níž BCG vakcína chrání nejen před onemocněním TBC a proti generalizovaným formám TBC ale také proti získání infekce, čili působí již na cestě od tuberkulosní expozice po onemocnění, proto také ve velkých městech Velké Británie již byla znovu zavedena plošná vakcinace od 0-12 měsíců a všech dětí do 16 ti let.

Tyto informace a další je možné najít na stránkách - www.SSPf.cz

BCG vakcínu dodává firma Avenier ve specifickém léčebném programu.

prosinec 2013

podpis příslušného lékaře
v dané oblasti